

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: /TT&BVTV-BVTV
V/v điều tra, theo dõi và phòng trừ
bệnh chết héo trên cây Keo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp.

Bệnh chết héo cây keo do nấm *Ceratocytis* sp. gây ra, đây là bệnh hại nguy hiểm và có thể gây ra thiệt hại lớn trong sản xuất keo nguyên liệu. Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật cho thấy: Hiện nay trên địa bàn tỉnh bệnh chết héo cây keo đã phát sinh, gây hại và có xu hướng tăng nhanh trên hầu khắp các diện tích rừng keo, nhất là những diện tích keo thời kỳ từ tuổi 1-3. Cục bộ một số lô có tỉ lệ bệnh lên đến 70-80% như xã Thanh Hương huyện Thanh Chương, xã Minh Thành huyện Yên Thành,... Dự báo trong thời gian tới bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan gây cháy lá và chết cây trên diện rộng nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời.

Để chủ động phát hiện, phòng trừ có hiệu quả đối với bệnh chết héo cây keo, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các chủ rừng thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện kịp thời tình hình phát sinh, mức độ gây hại và đánh giá khả năng lây lan của bệnh chết héo tại các vùng trồng keo nguyên liệu trên địa bàn, nhất là trên các diện tích keo thời kỳ 1-3 năm tuổi.

- Hướng dẫn các địa phương, chủ rừng phát hiện, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh và chỉ đạo phòng trừ bằng các biện pháp sau.

- + Đối với diện tích keo có tỷ lệ cây nhiễm bệnh dưới 15%: Tiến hành chặt, mang ra khỏi rừng và tiêu hủy (đốt) các cây bị bệnh chết héo; giữ lại các cây chưa có triệu chứng bị bệnh.

- + Đối với diện tích keo có tỷ lệ cây nhiễm bệnh trên 15% đến 50%: Tiến hành chặt, mang ra khỏi rừng và tiêu hủy các cây bị bệnh; đồng thời, áp dụng biện pháp hóa học cục bộ theo đám (khi cây chết theo đám) hoặc toàn bộ lô (khi cây chết rải rác). Sử dụng thuốc trừ bệnh có hoạt chất Metalaxyl (Metaxyl 500WP,...), Mancozeb (Manozeb 80WP,...), Metalaxyl + Mancozeb (Lanomy 680WP, Ridomid gold 68WG,...), theo nông độ khuyến cáo.

Chú ý: Lượng dụng dịch thuốc sử dụng tối thiểu 400-600 lít/ha, phun nhắc lại 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày. Không tận thu, vận chuyển các cây bị bệnh chết héo sang nơi khác.

+ Đối với diện tích keo có tỷ lệ cây nhiễm bệnh trên 50%: Tiến hành phá bỏ, thanh lý rừng theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên báo cáo kết quả điều tra, theo dõi và kết quả chỉ đạo phòng trừ đối với bệnh chết héo hại keo về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật qua chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nhận được công văn này đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT BVTV vùng khu 4 (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- Chi cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phan Duy Hải