

Số: /TT&BVTV-BVTV

Nghệ An, ngày tháng năm 2022

V/v tăng cường theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu,  
bệnh hại chính trên lúa vụ Hè thu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;
- Các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp.

Vụ lúa Hè thu năm 2022 toàn tỉnh đã gieo cấy trên 61.516 ha, hiện các trà lúa đang thời kỳ đứng cái, làm đòng đến trổ, nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự báo thời gian lúa Hè thu trổ đến chắc xanh cũng là thời điểm chuyển mùa nên diễn biến thời tiết sẽ phức tạp (mưa, giông lốc, gió mạnh,...) thuận lợi cho các sâu bệnh hại chính như: Bệnh bạc lá vi khuẩn, nhện gié, bệnh lem lép hạt, chuột, bệnh khô vằn, rầy các loại,... phát sinh, gây hại nặng trên diện rộng, gây thiệt hại đến năng suất, sản lượng lúa Hè thu nếu không phát hiện, tổ chức phòng trừ kịp thời.

Để chủ động phát hiện, phòng trừ kịp thời, hiệu quả hạn chế tối đa thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các địa phương, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp tăng cường chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau:

- Tập trung phân công, chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường giám sát đồng ruộng. Phân vùng, phân trà để xác định chính xác thời gian trổ của các trà lúa. Theo dõi, dự tính dự báo chính xác diễn biến phát sinh của các sâu bệnh hại chính, những vùng, diện tích có nguy cơ bị sâu, bệnh gây hại nặng cần tập trung chỉ đạo phòng trừ, đặc biệt trong thời gian lúa ôm đòng trổ đến chắc xanh.

- Khuyến cáo, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp canh tác như: Bón phân, cân đối, đúng kỹ thuật; tránh bón thừa đạm, bón lai rai, đảm bảo đủ nước trong thời gian lúa ôm đòng đến chắc xanh.

- Tham mưu các biện pháp kỹ thuật phòng trừ kịp thời, cụ thể cho UBND các cấp, đồng thời phối hợp với các ban, ngành liên quan trên địa bàn tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, nông dân phòng trừ hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu, bệnh gây ra.

- Biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính:

- + Đối với bệnh bạc lá vi khuẩn: Phun trừ sớm khi bệnh mới bắt đầu xuất hiện để hạn chế tác hại của bệnh bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Oxolinic acid (Starner 20WP,...); Ningnamycin (Kozuma 5WP,...); Bronopol (Xantoxin 40WP, Totan 200WP,...); Bismertiazol (Xanthomix 20WP,...); Kasugamycin (Kasumin 2SL,...);... phun theo lượng khuyến cáo và phun lại lần 2 cách 5 - 7 ngày nếu bệnh vẫn tiếp tục phát sinh, phát triển. Lưu ý: Không sử dụng kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá trên diện tích lúa đã và đang nhiễm bệnh.

+ Đối với nhện gié: Vào giai đoạn làm đòng đến trổ nếu phát hiện những diện tích có 3 - 5% số dảnh bị nhện gây hại trở lên, cần tổ chức phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Hexythiazox (Nissorun 5EC,...); Fenitrothion (Danitol 50EC,...), Pyridaben (Dandy 15EC, Alfamite 20WP),... Khi phun cần chú ý tăng lượng nước thuốc để phun ướt đều phần thân và bẹ lá lúa.

+ Đối với bệnh lem lép hạt: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chú ý các trà lúa trổ gặp mưa kéo dài, cần phun phòng sớm bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Difenoconazole + Propiconazole (Tilt Super® 300EC, Tiptop gold 400EC,...); Propiconazole (Tiptop 250 EC...); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325 SC,...); Tebuconazole + Trifloxystrobin (Nativo 750WG,...);... Phun 2 lần vào giai đoạn lúa trổ 1 - 3% và sau khi lúa trổ hoàn toàn.

+ Đối với chuột: Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo kế hoạch số 2143/KH-SNN-TT&BVTV ngày 24/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Hè thu - Mùa và vụ Đông năm 2022.

Nhận được công văn này đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện tốt nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Trung tâm BVTV vùng 4 (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- Chi cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT.

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Phan Duy Hải**