

## **HƯỚNG DẪN**

### **Sử dụng thuốc Gimlet 0.2 GB diệt chuột hại cây trồng**

Thực hiện Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2022 và vụ Xuân năm 2023. Chi cục Trồng trọt sẽ thực hiện bàn giao thuốc trừ chuột Gimlet 0.2 GB cho các địa phương trong thời gian từ ngày 27/2/2023 đến ngày 06/3/2023. Để đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả trong sử dụng thuốc diệt chuột Gimlet 0.2 GB trên đồng ruộng sau khi được cấp phát, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc như sau:

#### **1. Về đặc điểm của thuốc:**

- Thuốc diệt chuột Gimlet 0.2 GB là thuốc diệt chuột dạng bả trộn sẵn có chứa hoạt chất Diphacinone thuộc nhóm chống đông máu, thể hệ mới.
- Thuốc không mùi và không gây co giật khi chuột ăn phải thuốc, sau khi ăn phải thuốc chuột sẽ ngừng cắn phá, bị xuất huyết đường ruột, chảy máu mắt và bắt đầu chết sau 3 ngày, cao nhất ở 6 – 7 ngày. Chuột thường chết trong hang nên ít gây ô nhiễm môi trường.

#### **2. Cách sử dụng thuốc**

- Lượng thuốc sử dụng: Tùy theo số lượng chuột có trên đồng ruộng, những vùng có mật độ chuột thấp sử dụng 2 - 5 kg/ha và 5 - 6 kg/ha đối với những vùng có mật độ chuột cao. (Lượng thuốc Gimlet 0.2 GB cần để gây chết chuột bằng trọng lượng chuột x 0.15. Ví dụ: Để gây chết 1 con chuột có trọng lượng 120 gam thì số gam GIMLET 0.2GB cần là: 120 gam x 0,15 = 18gam).
- Lựa chọn địa điểm diệt chuột: Ưu tiên tập trung diệt chuột ở những nơi chuột thường cư trú như: Mương máng, bờ vùng, vùng cón vệ, nghĩa trang, công trình thủy lợi, quanh các trang trại,....
- Cách sử dụng: Đặt thuốc tại cửa hang, đường đi của chuột hoặc nơi chuột hay cắn phá nếu không phát hiện thấy hang hay đường đi của chuột. Lượng thuốc sử dụng cho mỗi điểm 20 - 30 gam. Kiểm tra các điểm đặt thuốc sau 2 – 4 ngày, nếu chuột ăn hết cần phải bổ sung thêm cho đến khi chuột không ăn nữa thì thôi. Trong trường hợp đất bị ẩm ướt, mưa phùn cần phải lót nilon hoặc rải trấu trước khi đặt thuốc và phủ trấu lên để tránh bị mưa ẩm làm giảm chất lượng thuốc.

### 3. Đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc:

- Bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp. Để thuốc xa trẻ em, thực phẩm, vật nuôi và nguồn nước. Giữ kín trong bao gói gốc được dán nhãn.

- Khi sử dụng thuốc phải có dụng cụ bảo hộ lao động như: Khẩu trang, kính mắt, găng tay,... cấm biến cảnh báo khu vực đặt thuốc, thông báo trên hệ thống truyền thanh thời gian đặt thuốc để nhân dân chủ động bảo vệ gia súc, gia cầm và các động vật máu nóng. Hàng ngày thu gom xác chuột để đốt tiêu hủy hoặc chôn xa khu dân cư, nguồn nước sinh hoạt.

*Lưu ý: Để nâng cao hiệu quả diệt chuột, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, xóm thành lập các tổ diệt chuột để tổ chức diệt chuột đồng loạt, tập trung ở những khu vực nhiều chuột, những nơi chuột cư trú.*

Vậy Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo các địa phương và nông dân thực hiện tốt nội dung hướng dẫn trên./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- Trung tâm BVTV (để báo cáo);
- UBND các huyện, TP, TX (để thực hiện)
- Các TTDVNN huyện (để thực hiện);
- Lãnh đạo chi cục (để biết);
- Lưu VT.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Tiến Đức**